



Вінниця 12-13 вересня

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
ОФТАЛЬМОЛОГІВ

**ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ ОФТАЛЬМОЛОГІВ,
ПРИСВЯЧЕНА 80-РІЧЧЮ
ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА
ОФТАЛЬМОЛОГІВ**

**Програма-запрошення
сателітного симпозиуму**

**12-13 Вересня, 2018 року
м. Вінниця**

**Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
Актова зала нового хірургічного корпусу**

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Компанія САНТЕН та Організаційний комітет Конференції

«ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ОФТАЛЬМОЛОГІВ, ПРИСВЯЧЕНА 80-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА ОФТАЛЬМОЛОГІВ»

Щиро запрошує Вас взяти участь у цьому вагомому науковому заході, який відбудеться 12-13 Вересня, 2018 року у м. Вінниця.

Із свого боку компанія Сантен запрошує Вас відвідати сателітний симпозиум **о 14-00 годині, 12 вересня**, у головній аудиторії, який буде присвячений новітнім підходам у менеджменті пацієнтів із глаукомою та синдромом сухого ока.

ПРОГРАМА САТЕЛІТНОГО СИМПОЗИУМУ

- | | |
|---------------|---|
| 14.00 – 14.30 | Prof. M. Calonge (Spain) A new approach to achieving efficacy in DED: Cyclosporine A 0,1% in the clinical settings Проф. Маргарита Калонхе (Іспанія) Новий підхід успішного лікування при захворюванні сухого ока: 0,1% Циклоспорин А в клінічній практиці |
| 14.30 – 15.00 | Prof. A. Hommer (Austria) Modern medical management in the treatment of glaucoma: 24 h disease control Проф. Антон Хоммер (Австрія) Сучасний підхід у лікуванні глаукоми: 24 годинний контроль захворювання |

Тафлотан®: МЕНШ ВИРАЖЕНІ КОЛИВАННЯ ВОТ ПРОТЯГОМ ДОБИ У ПОРІВНЯННІ З ЛАТАНОПРОСТОМ^{1,2}

КОЛИВАННЯ СЕРЕДЬОГО МАКСИМАЛЬНОГО ДОБОВОГО ВОТ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРЕПАРАТУ **Тафлотан®** В ПОРІВНЯННІ З ЛАТАНОПРОСТОМ З ДОДАВАННЯМ КОНСЕРВАНТІВ¹



На основі матеріалів Konstas 2013. 3-місячне проспективне, з маскуванням спостерігача, перехресне дослідження в порівнянні з латанопростом з додаванням консервантів у пацієнтів з вперше діагностованою відкритокутовою глаукомою (n=38).

На основі матеріалів Konstas 2017. 3-місячне проспективно наглядове, з маскуванням спостерігача, з переведенням з одного препарату на інший / перехресне порівняльне дослідження препарату Тафлотан® з латанопростом з додаванням консервантів у пацієнтів з відкритокутовою глаукомою з середніми значеннями ВГД до лікування 30,6 мм рт. ст. і наявністю клінічних проявів / симптомів ураження очної поверхні (n=43).

Коливання ВОТ є фактором ризику прогресування глаукоми³

В обох дослідженнях коливання представляли собою середнє значення різниці між максимальними та мінімальними значеннями ВОТ у кожного пацієнта^{1,2}

1. Konstas A.G.P. et al. Br J Ophthalmol 2013; 97 (12): 1510–1515. 2. Konstas A.G.P. et al. Adv Ther 2017; 34 (1): 221–235. 3. Actis A.G. et al. Open Ophthalmol J 2016; 10: 129–139.

СИНДРОМ СУХОГО ОКА: РОЗІРВАТИ ПОРОЧНЕ КОЛО

ЦИКЛОСПОРИН А (CSA) КАТІОННА ЕМУЛЬСІЯ (СЕ) 0,1% ВПЛИВАЄ НА ЗАПАЛЕННЯ ПРИ СИНДРОМІ СУХОГО ОКА (ССО) ЧИМ РОЗРИВАЄ ПОРОЧНЕ КОЛО




CsA CE 0.1% має здатність зменшувати запалення поверхні ока у пацієнтів з ССО, як це було продемонстровано на значному зниженні від вихідного рівня експресії HLA-DR (біомаркер запалення⁴) на поверхні кон'юнктивальних клітин, у порівнянні із носієм^{5,6}


HLA-DR

CsA CE 0.1% vs Носій

SANSIKA (Зміни від вихідного рівня)



SICCANOVE (Зміни від вихідного рівня)



Експресія HLA-DR (оцінювана за цитологією) через 6 міс рандомізованого оцінювання CsA CE 0,1% або носія у дослідженнях Фази III SANSIKA та SICCANOVE



Фарбування поверхні ока, включаючи флюоресциїнову пробу, широко використовується для оцінки пошкодження очної поверхні у пацієнтів з ССО⁷



CsA CE 0.1% має здатність знижувати пошкодження поверхні рогівки у пацієнтів з ССО, про що свідчить значне поліпшення від базового рівня до 6-го місяця в оцінках флюоресциїнової проби в порівнянні з носієм^{5,6}

4. Baudouin C, et al. Br J Ophthalmol 2014;98:1168-1176. 5. Leonardi A, et al. Eur J Ophthalmol 2016;26:287-296. 6. Baudouin C, et al. Eur J Ophthalmol 2017;27:520-530. 7. Wolffsohn JS, et al. Ocul Surf 2017;15:539-574.

Цей матеріал не є рекламою лікарського засобу, містить виключно наукову та медичну довідкову інформацію, призначений для персонального використання і / або надано за запитом. Перед призначенням будь-якого препарату, згаданого у цьому матеріалі, будь ласка, ознайомтеся з повним текстом інструкції виробника щодо застосування препарату. SANTEN не рекомендує використовувати продукти з метою, які відрізняються від описаних в інструкції по застосуванню даної продукції. Справжній матеріал призначений лише для медичних фахівців і для розповсюдження під час спеціалізованих медичних заходів і для друку в спеціалізованих медичних журналах (виданнях). Виготовлений: серпень 2018. Дійсний до: серпень 2019.

Представництво «Сантен ОЙ» в Україні:

м. Київ, вул. М. Пимоненка, 13, корпус 7-В, офіс 15. Тел. : +38 044 200 68 85.